

Betegtájékoztató és bejegyző lap			
Dokumentum címe:	A vastagbél tükrözéses vizsgálata - colonoscopia		
Változat: 04	Hatályos: 2014.10.14.	1.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás 3
Dokumentum száma: Bny./B./01.	Hatályba helyezte: Dr. Pintér István osztályvezető főorvos		

Beteg neve: TAJ szám:

A vizsgálat/beavatkozás tervezett időpontja:.....

Mi a kolonoszkópia?

A vastagbéltükrözés jelenleg a legkorszerűbb vizsgálati módszer a végbélben, a vastagbélben és a vékonybél utolsó 10–20 cm-es szakaszában megjelenő betegségek (például gyulladás, fekély, daganat) kórismézéséhez. Emellett számos esetben gyógyító beavatkozásra is lehetőség van, például jóindulatú daganat (polip) levételére vagy ritkábban vérzésstillapításra, szűkületek tágítására.

Mi a teendő a vizsgálat előtt?

Csak tiszta vastagbél vizsgálható, így a megfelelő előkészítés elengedhetetlen feltétele a sikeres vizsgálatnak. A vizsgálatot megelőző napon történik a vastagbél tisztítása hashajtó oldattal (pl. Endostar Lavage, G-oldat vagy Fleet phospho soda, Picoprep). Kérjük, pontosan kövesse az előkészítőkhöz mellékelt betegtájékoztatót! Étrendi megszorítások is szükségesek a vizsgálatot megelőző napokban, rostos, nehezen emészthető ételeket ne fogyasszon.

A vizsgálat éhgyomorral történik, ezért a vizsgálat előtt 6–8 órával szilárd étel, 4 órával pedig folyadék sem fogyasztható. Kérjük, hogy rendszeresen szedett gyógyszerei közül a szokott időben csak a vérnyomáscsökkentőket és szívgyógyszereit vegye be néhány korty vízzel! Cukorbetegsége miatt szedett gyógyszereket, inzulint a vizsgálat utáni első étkezéshez időzítve folytassa!

Diagnózis (jelenlegi egészségi állapot magyarul):

A vizsgálat menete:

A vizsgálat hanyatt- vagy oldalfekvő testhelyzetben történik, általában bódító-fájdalomcsillapító injekció adását követően. A végbélen keresztül vagy műtét során képzett stoma nyíláson egy hajlékony optikai műszert vezetünk végig a vastagbél egész hosszában. A megfelelő tájékozódáshoz az eszközön keresztül levegő befúvása, vízzel történő öblítés is szükséges. A levegő befúvása székelési ingert, esetleg kisebb görcsöt, puffadásérzést okozhat. Előfordulhat, hogy a vizsgálat során megkérjük testhelyzete megváltoztatására, ebben az asszisztensnő is segíteni fogja. Elváltozások észlelése esetén szövetminta vétele, polipok esetén azok eltávolítása is indokolt. Utóbbi esetben a vizsgálat előtti héten laborvizsgálatok is ajánlottak (vérkép, PTR/INR, aPTI). Injekció adása illetve az endoszkópos műtėti beavatkozás után a beteg kórházi megfigyelése válhat szükségessé. A vizsgálat ideje kellő együttműködés mellett körülményektől függően 15-60 perc.

Szokatlan panasz esetén forduljon a vizsgálatot végző orvoshoz ill. osztályhoz!

Mi a teendő a vizsgálat után?

Ha bódító injekciót kapott, aznap nem vezethet gépjárművet a reakcióképesség csökkenése, reflexek romlása miatt; ezért minden esetben azt ajánljuk, hogy kísérővel érkezzen a vizsgálatra. A vizsgálatot követő 2–3 órában csak folyadékot fogyasszon, azt követően panaszmentesség esetén már étkezhet, folytathatja szokásos napi tevékenységét.

Lehetséges szövődmények:

Amennyiben a vizsgálatot tapasztalt szakember végzi, a szövődmények ritkák. Előfordulhat az érzéstelenítőszer illetve a nyugtató iránti túlérzékenység, műszer okozta sérülés, szövettani mintavételt vagy polip levételét követően jelentkező vérzés vagy a tápcsatorna falának sérülése. Rendkívül ritka esetben a szövődmények ellátása érdekében sürgős műtét is szükségessé válhat (1000 esetben 1). Amennyiben a vizsgálat után több órával is hasi fájdalmat, görcsöket észlelne, értesítse vizsgáló orvosát vagy ügyeleti

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	A vastagbél tükrözéses vizsgálata - colonoscopia		
Változat: 04	Hatályos: 2014.10.14.	2.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás 3
Dokumentum száma: Bny./B./01.	Hatályba helyezte: Dr. Pintér István osztályvezető főorvos		

időben az ügyeletes orvost! Mintavétel vagy poliplevétél után széklete néhány csepp vért tartalmazhat, ennél nagyobb mennyiség ürítése esetén kontroll vizsgálata szükséges.

A vastagbél tükrözés elmaradásának lehetséges következményei:

Széketürítési és bél panaszok esetén kellő időben elvégzett vastagbéltükrözés a vastagbél betegségeiben korai és pontos diagnózist ad, ezáltal az endoscopos és sebészi beavatkozások, valamint a gyógyszeres kezelés a betegségek korai stádiumában elvégezhető, amittől sokkal eredményesebb gyógyulás várható.

Lehetséges alternatív, helyettesítő vizsgálat:

- Vastagbél kontrasztanyagot rtg vizsgálata – irrigoscopia
- Virtuális colonographia

Ezen beavatkozások diagnosztikai értéke kisebb, műtéti beavatkozás és szövettani mintavétel nem lehetséges. A beöntéses rtg. vizsgálat (irrigoscopia) után legtöbbször vastagbéltükrözésre van szükség a kórisme pontosítása és endoscopos műtéti beavatkozás elvégzése céljából.

Beleegyezési nyilatkozat

A beavatkozásról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, ezzel kapcsolatban további kérdésem nincs. A beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, kérem annak elvégzését. Egyetértek továbbá, a beavatkozás során szükségessé váló egyidejű endoszkópos műtéttel is.

.....
 a felvilágosítást végző személy

.....
 beteg / törvényes képviselő aláírása

Siófok, év..... hó..... nap..... óra..... perc

Elutasító nyilatkozat

A vizsgálat elutasításának lehetséges egészségügyi következményeiről tájékoztattak. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a vizsgálatot visszautasítom, kezelőorvosomat nem terheli felelősség az emiatt fellépő káros következményekért, illetve betegségem kedvezőtlen alakulásáért. A kezelőorvos részletes felvilágosítása – amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazza – ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....
 a felvilágosítást végző személy

.....
 beteg / törvényes képviselő aláírása

1. Tanú:.....
 aláírás

2. Tanú:.....
 aláírás

Siófok, év..... hó..... nap..... óra..... perc

Ezen lap egy aláírt példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!