

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Nasojejunalis tápszonda levezetése		
Változat: 03	Hatályos: 2014.09.03.	1.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./B./11.	Hatályba helyezte: Dr. Pintér István osztályvezető főorvos		

Beteg neve: TAJ szám:

A vizsgálat/beavatkozás tervezett időpontja:.....

Mi a nasojejunalis táplálás lényege?

Endoscopos vagy radiológiai kontrol mellett a jejunumba (vékonybél 3. kacsába) helyezett tápszondán át folyékony táplálék bejuttatása a részlegesen vagy teljesen működő béltraktusba.

Beavatkozás célja:

A klinikai leromlás, tápanyag- hiány állapot megszüntetése és ennek következtében fellépő komplikációk (infectio veszély, elhúzódó sebgyógyulás, tápanyag felszívódási zavar, postoperatív komplikációk, gyógyszeres kezeléssel szembeni csökkent tolerancia) kivédése.

Diagnózis (jelenlegi egészségi állapot magyarul):

Mi a teendő a vizsgálat előtt?

A vizsgálat éhgyomorral történik, ezért a vizsgálat előtt 6–8 órával szilárd étel, 4 órával pedig folyadék sem fogyasztható.

Vizsgálat menete:

A beteg a beavatkozás előtt iv. sedatívumot kap. Garatérzéstelenítést követően a szondát orron át a gyomorba vezetjük. Gastroscopot a száj-garat üregeken át a gyomorba vezetjük és endoscopos kontroll mellett a szondát a pyloruson (gyomor kimeneti szájadéka) át a patkóbél lumenébe, majd a felső vékonybél 3. kacsába toljuk. Gastroscopot eltávolítjuk, a szonda helyzetét rtg. segítségével ellenőrizzük, majd a szondából a vezetődrótot eltávolítjuk. A szondát a beteg orrához rögzítjük.

Mi a teendő a vizsgálat után?

A beavatkozás után panaszmentesség esetén a szondatáplálás fokozatosan bevezethető (a tápszert kezdetben hígítva célszerű adagolni, és csak napokkal később ajánlatos áttérni a hígítás nélküli adagolásra).

A beavatkozás szövődményei:

Orr-garat nyálkahártya sérülés, sinusitis, szonda légutakba jutása, hányás.

A beavatkozás elmaradásának következményei:

Beteg állapotának rosszabbodása, csökkent ellenálló képesség, súlyos infekciók, decubitus kialakulása, elhúzódó kórházi kezelés, postoperatív komplikációk kialakulása.

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Nasojejunalis tápszonda levezetése		
Változat: 03	Hatályos: 2014.09.03.	2.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./B./11.	Hatályba helyezte: Dr. Pintér István osztályvezető főorvos		

Lehetséges alternatív megoldások:

1. Nasogastricus szondatáplálás, ami hasonló kellemetlenségekkel jár, de hatása nem egyenértékű.
2. Teljes parenteralis táplálás – teljes értékű táplálás intravénás úton – csak nem működő béltraktus esetén teljes értékű.

Beleegyezési nyilatkozat

A beavatkozásról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, ezzel kapcsolatban további kérdésem nincs. A beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, kérem annak elvégzését.

.....
a felvilágosítást végző orvos

.....
beteg / törvényes képviselő aláírása

Siófok, év..... hó..... nap..... óra..... perc

Elutasító nyilatkozat

A vizsgálat elutasításának lehetséges egészségügyi következményeiről tájékoztattak. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a vizsgálatot visszautasítom, kezelőorvosomat nem terheli felelősség az emiatt fellépő káros következményekért, illetve betegségelem kedvezőtlen alakulásáért.

A kezelőorvos részletes felvilágosítása – amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazza – ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....
a felvilágosítást végző orvos

.....
beteg / törvényes képviselő aláírása

1. Tanú:.....
aláírás

2. Tanú:.....
aláírás

Siófok, év..... hó..... nap..... óra..... perc

Ezen lap egy aláírt példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!