

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Állkapocsszöglet alatti nyálmirigy eltávolítás (submandibularis nyálmirigy eltávolítás)		
Változat: 03	Hatályos: 2015.08.04.	1.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás: 2
Dokumentum száma: Bny./FOG./06	Hatályba helyezte: Dr. Czurkó Géza osztályvezető főorvos		

Beteg neve: TAJ száma:

Tisztelt Betegünk!

Tájékoztatjuk, hogy Önnek mielőbbi gyógyulása érdekében állkapocsszöglet alatti (submandibularis) nyálmirigy eltávolítása válik szükségessé. A Siófoki Kórház Fül-Orr-Gége Osztály gyógyító csoportja a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy – mindent mérlegelve – döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

A beavatkozás jellege:

Terápiás jellegű műtéti beavatkozás.

A beavatkozás célja:

A krónikusan gyulladt, megnagyobbodott, sokszor több nyálkővet is tartalmazó nyálmirigy eltávolítása.

- jobb oldal
- bal oldal

Diagnózis (jelenlegi egészségi állapot magyarul):

A beavatkozás tervezett időpontja:

Beavatkozás előtti történések:

Műtét előtt altató orvos is megvizsgálja a beteget. Műtéti napon éjfél-től a műtetre készülőknek **TILOS** ennie és innia! Műtét előtt kb. fél órával megkapja az előkészítő, előaltató injekciót, még a kórteremben. Innentől kezdve **TILOS és VESZÉLYES** felkelni.

Beavatkozás módja:

A műtétet altatásban végezzük. Az adott oldalon az állkapocs csont íve alatt metszést ejtünk, melyen keresztül kipreparáljuk a nyálmirigyét. Közben a nyálmirigyen átfutó ereket (arc artéria) lekötjük, majd a nyálmirigy kivezető csövét lekötés után átvágjuk. Szívódrén behelyezése után a sebet rétegesen zárjuk.

Szövődmények:

Általános altatási szövődmények: erről az altatóorvos tájékoztatja Önt.

A műtét lehetséges szövődményei:

- gyógyszerallergia, érzéstelenítő-, altatószerre
- az előkészítő injekció szövődményei (tályog, ér- és idegsérülés, fájdalmak, hegek)
- utóvérzés: ritkán fordul elő, erős utóvérzés fellépésekor a seb ismételt feltárása válhat szükségessé.
- ritkán idegsérülések fordulnak elő, így az arcideg szájzugi ága sérülhet, aminek következtében a szájzug lejjebb áll, az étkezés és a beszéd nehezítetté válik. Nagyon ritkán a nyelvmozgató ideg sérülhet, aminek következtében a nyelv azonos fele mozgásképtelenné válik, következményes étkezései és beszédzavarokkal.

Beavatkozás utáni történések, várható következmények:

Naponta kötéscserék, az első időkben a szívódrén rendszeres ürítése, fájdalomcsillapítás. Elbocsátás előtt varratszedés.

Mi a teendő beavatkozás után?

5-8 napos kórházi megfigyelés szükséges, ez idő alatt pihenés, majd otthonában még 2 hét fizikai munkától való tartózkodás javasolt.

Betegtájékoztató és beleegyző lap			
Dokumentum címe:	Állkapocsszöglet alatti nyálmirigy eltávolítás (submandibularis nyálmirigy eltávolítás)		
Változat: 03	Hatályos: 2015.08.04.	2.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás: 2
Dokumentum száma: Bny./FOG./06	Hatályba helyezte: Dr. Czurkó Géza osztályvezető főorvos		

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

Esetlegesen gyógyszeres kezelés, de nyálkővesség esetén csak a műtét jöhet szóba.

A műtét elmaradásának következményei:

Ismétlődő nyálmirigygyulladások, kő okozta elzáródás esetén ismétlődő fájdalmas duzzanatokkal.

Beleegyezési nyilatkozat

A beavatkozásról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, kérem annak elvégzését.

.....
tájékoztatót adó orvos neve

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

(Írástudatlan személynél két tanú jelenlétével kell feljegyezni a beleegyezést.)

Siófok,évhónapóraperc

Elutasító nyilatkozat

A kezelőorvos részletes felvilágosítása – amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazta – ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....
tájékoztatót adó orvos neve

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

1. Tanú:
aláírás

2. Tanú:
aláírás

Siófok,évhónapóraperc

Ezen lap egy aláírt példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!