

Betegtájékoztató és beleegyező lap

Dokumentum címe:	Garattályog megnyitása		
Változat: 03	Hatályos: 2015.08.04.	1.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás: 2
Dokumentum száma: Bny./FOG./08	Hatályba helyezte: Dr. Czurkó Géza osztályvezető főorvos		

Beteg neve: TAJ száma:

Tisztelt Betegünk / Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk, hogy Önnek/gyermekének mielőbbi gyógyulása érdekében garattályog megnyitásának elvégzése válik szükségessé. A Siófoki Kórház Fül-Orr-Gége Osztály gyógyító csoportja a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy – mindent mérlegelve – döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

A beavatkozás jellege:

Terápiás jellegű beavatkozás.

A beavatkozás célja:

A garatban – leggyakrabban a torokmandulák mellett, mögött – kialakult tályog tartalmának kiürítése, ezzel a fájdalom megszüntetése, a szövődmények megelőzése.

Diagnózis (jelenlegi egészségi állapot magyarul):
A beavatkozás tervezett időpontja:

Beavatkozás módja:

A garatnyálkahártyát érzéstelenítjük (részben Lidocain spray részben Lidocain injekció segítségével, gyermekeket altatjuk). Vastag tűvel a tályogüreget megsúrjuk, a genny egy részét leszívjuk. A tályog falán szikével metszést ejtünk, a sebszéleket tompa eszközzel feltágítjuk, a tályogot kiürítjük. Hyperolos öblítést végzünk. A sebtágítást naponta ismételni kell a gennyürülés megszűntéig.

Szövődmények:

Bevérzés a környező szövetekben (spontán felszívódik). Rendellenes lefutású ér átvágás következtében erős vérzés léphet fel – azonnal ellátásra kerül.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

A már kialakult garattályog kezelése csak a fenti módon lehetséges. Néha előfordul, hogy a tályog spontán áttör, ezt megvárni a szövődményveszély és a kínzó nyelési panaszok miatt nem ajánlatos.

Mi a teendő a beavatkozás után?

Hyperolos öblögetés, folyékony – pépes étrend, antibiotikus kezelés, szájkendő viselése, tágítások.

A beavatkozás elmaradásának következményei:

1. Nyelési akadály.
2. Szövődmények alakulhatnak ki – a gyulladós folyamat (oedema) áttérjedhet a gégebemenetre (fulladásveszély!).
3. A tályog betörhet a környező szövetekbe, ezzel életveszélyes állapotot idézhet elő.
4. Környező erek is károsodhatnak, kisebb-nagyobb vérzés léphet fel.

Betegtájékoztató és beleegyező lap

Dokumentum címe:	Garattályog megnyitása		
Változat: 03	Hatályos: 2015.08.04.	2.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás: 2
Dokumentum száma: Bny./FOG./08	Hatályba helyezte: Dr. Czurkó Géza osztályvezető főorvos		

Beleegyezési nyilatkozat

A beavatkozásról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, kérem annak elvégzését.

.....
 tájékoztatót adó orvos neve

.....
 beteg/törvényes képviselő aláírása

(Írástudatlan személynél két tanú jelenlétével kell feljegyezni a beleegyezést.)

Siófok,évhónapóraperc

Elutasító nyilatkozat

A kezelőorvos részletes felvilágosítása – amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazta – ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....
 tájékoztatót adó orvos neve

.....
 beteg/törvényes képviselő aláírása

1. Tanú:
 aláírás

2. Tanú:
 aláírás

Siófok,évhónapóraperc

Ezen lap egy aláírt példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!