

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Homloküreg műtét külső feltárásból (Op. Jansen-Ritter)		
Változat: 03	Hatályos: 2015.08.04.	1. oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás: 2
Dokumentum száma: Bny./FOG./07	Hatályba helyezte: Dr. Czurkó Géza osztályvezető főorvos		

Beteg neve: ..... TAJ száma: .....

### Tisztelt Betegünk / Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk, hogy Önnek/gyermekének mielőbbi gyógyulása érdekében homloküreg műtét külső feltárásból válik szükségessé. A Siófoki Kórház Fül-Orr-Gége Osztály gyógyító csoportja a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy – mindent mérlegelve – döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

#### A beavatkozás jellege:

Terápiás jellegű műtéti beavatkozás, melyet altatásban végzünk.

#### A beavatkozás célja:

Csak akkor végezzük, ha a homloküregben olyan elváltozás van, mely az orrüreg felől endoszkóppal el nem érhető, vagy biztonsággal nem ellenőrizhető: lezárt tályog, jó vagy rosszindulatú daganat.

Diagnózis (jelenlegi egészségi állapot magyarul): .....

A beavatkozás tervezett időpontja: .....

#### Beavatkozás előtti történések:

Teljes körű kivizsgálás, osztályos felvétel.

Műtét előtt altató orvos is megvizsgálja a beteget. Műtéti napon éjfél-től a műtetre készülőknek **TILOS** ennie és innia! Műtét előtt kb. fél órával megkapja az előkészítő, előaltató injekciót, még a kórteremben. Innentől kezdve **TILOS és VESZÉLYES** felkelni.

#### Beavatkozás módja:

A beteg arcüreg oldalán az orrgyöktől a szemöldökre hajlóan bőrmetszést végzünk, a homloküreg elülső és alsó falát szabaddá tesszük (a szemüreg képleteit lapocccal eltartjuk védjük).

Az üreg tartalmának kiürítése után az orrüreg felé lehetőleg széles levezetést készítünk. Az üregbe az orron át kivezetett gumi drént helyezünk. A sebet zárjuk.

#### Szövődmények:

Az alapbetegségtől is függően károsodhatnak a szemizmok (kettős látás), szabaddá válhat, sérülhet a kemény agyhártya.

#### Beavatkozás utáni történések, várható következmények:

Az ébredés után fokozott felügyeletet igényel. Minden állapotváltozást a nővérrel – kezelőorvossal azonnal közölni kell.

Az orrból kivezetett és az arcon rögzített gumi drént 7-8 napig viselni kell. eltávolítása, valamint varratszedés után otthonába bocsátható. Fizikai munkától még 1 hétig tartózkodjon.

Betegtájékoztató és beleegyző lap			
Dokumentum címe:	Homloküreg műtét külső feltárásból (Op. Jansen-Ritter)		
Változat: 03	Hatályos: 2015.08.04.	2.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás: 2
Dokumentum száma: Bny./FOG./07	Hatályba helyezte: Dr. Czurkó Géza osztályvezető főorvos		

### Mi a teendő beavatkozás után?

Az arcra rögzített katétert feszüléstől, huzogatástól óvni.

### Milyen alternatív megoldás lehetséges?

Gyulladásos betegségeknél a homloküreg is megfúrható – öblíthető (Beck csapolás).

Az endoszkópos orrüreg felőli műtétek is egyre hatékonyabbak, de nagyobb elváltozások, tumorok csak külső feltárásból távolíthatók el.

### A műtét elmaradásának következményei:

Korai vagy késői szövődmények megjelenése.

Amennyiben a betegnek műtétet ajánlunk, az szakmailag mindig a kisebb rizikót jelenti.

### Beleegyezési nyilatkozat

A beavatkozásról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyzem, kérem annak elvégzését.

.....  
tájékoztatót adó orvos neve

.....  
beteg/törvényes képviselő aláírása

(Írástudatlan személynél két tanú jelenlétével kell feljegyezni a beleegyzést.)

Siófok, .....év .....hó .....nap .....óra .....perc

### Elutasító nyilatkozat

A kezelőorvos részletes felvilágosítása – amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazta – ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....  
tájékoztatót adó orvos neve

.....  
beteg/törvényes képviselő aláírása

1. Tanú: .....  
aláírás

2. Tanú: .....  
aláírás

Siófok, .....év .....hó .....nap .....óra .....perc

Ezen lap egy aláírt példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!