

Betegtájékoztató és beleegyező lap

Dokumentum címe:	Középső nyaki ciszta eltávolítása		
Változat: 04	Hatályos: 2015.08.04.	1. oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás: 3
Dokumentum száma: Bny./FOG./17	Hatályba helyezte: Dr. Czurkó Géza osztályvezető főorvos		

Beteg neve: TAJ száma:

Tisztelt Betegünk / Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk, hogy Önnek/gyermekének mielőbbi gyógyulása érdekében középső nyaki ciszta eltávolítása válik szükségessé. A Siófoki Kórház Fül-Orr-Gége Osztály gyógyító csoportja a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy – mindent mérlegelve – döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

A beavatkozás jellege:

Terápiás jellegű beavatkozás, mely altatásban történik.

A beavatkozás célja:

A magzati fejlődési maradványként visszamaradt a nyak közepén a nyelvcsont közelében visszamaradt kicsiny csövecské, a benne képződő mirigyváladéktól kerekded cisztává telődik. Befertőzödve tályoggá alakulhat, annak minden veszélyével. Ezért el kell távolítani.

Diagnózis (jelenlegi egészségi állapot magyarul):**A beavatkozás tervezett időpontja:****Beavatkozás előtti történések:**

Teljes körű kivizsgálás, osztályos felvétel.

Műtét előtt altató orvos is megvizsgálja a beteget. Műtési napon éjfél után a műtetre készülőknek **TILOS** ennie és innia! Műtét előtt kb. fél órával megkapja az előkészítő, előaltató injekciót, még a kórteremben. Innentől kezdve **TILOS és VESZÉLYES** felkelni. A műtőbe műtősgegd viszi.

Beavatkozás módja:

Az altató orvos elaltatja, az operáló orvos a nyakon a nyelvcsont magasságában haránt vagy hosszanti bőrmetszésből szabaddá teszi a cisztát, a nyelvcsont középső harmadával együtt. Ezen képleteket eltávolítja, a sebet zárja, kötést helyez rá.

Szövődmények:

Az altatás szövődményeiről az altató orvos nyilatkozik.

Leggyakoribb szövődmény, hogy a teljesen el nem távolított nyelvcsontot átfűrő ciszta részből a képlet ismét kiújul.

A műtétnél a környező képletek sérülhetnek. A műtét után vérzés, gyulladás alakulhat ki. Ellátásuk értelemeszerű.

Beavatkozás utáni történések, várható következmények:

Az ébredés után fokozott felügyeletet igényel. Minden rendellenességről a nővért/orvost haladéktalanul értesíteni kell.

Sebfájdalom, nyelési fájdalom miatt csillapítókat adunk.

Egy hét után varratszedés, ezután a beteg otthonába bocsátható. Fizikai munkától még 1 hétig tartózkodjon.

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Középső nyaki ciszta eltávolítása		
Változat: 04	Hatályos: 2015.08.04.	2.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás: 3
Dokumentum száma: Bny./FOG./17	Hatályba helyezte: Dr. Czurkó Géza osztályvezető főorvos		

Mi a teendő beavatkozás után?

A sebet víztől óvni.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

A ciszta leszívásával átmenetileg panaszmentessé tehető.

A műtét elmaradásának következményei:

A ciszta előbb utóbb elgennyed, begyullad, jobb esetben kiürül, rosszabb esetben a nyak képletei közé tör.

Spontán „gyógyulások” fokozódó hegesedést okoznak, mely a ciszta eltávolítását nagyon megnehezíti.

Beleegyezési nyilatkozat

A beavatkozásról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, kérem annak elvégzését.

.....
tájékoztatót adó orvos neve

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

(Írástudatlan személynél két tanú jelenlétével kell feljegyezni a beleegyezést.)

Siófok,évhónapóraperc

Elutasító nyilatkozat

A kezelőorvos részletes felvilágosítása – amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazta – ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....
tájékoztatót adó orvos neve

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

1. Tanú:
aláírás

2. Tanú:
aláírás

Siófok,évhónapóraperc

Ezen lap egy aláírt példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!