

Betegtájékoztató és bejegyző lap			
Dokumentum címe:	Nyitott arcüreg feltáró műtét (Luc-Caldwell)		
Változat: 03	Hatályos: 2015.08.04.	1. oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás: 2
Dokumentum száma: Bny./FOG./20	Hatályba helyezte: Dr. Czurkó Géza osztályvezető főorvos		

Beteg neve: ..... TAJ száma: .....

### Tisztelt Betegünk!

Tájékoztatjuk, hogy Önnek/gyermekének mielőbbi gyógyulása érdekében nyitott arcüreg feltáró műtét elvégzése válik szükségessé. A Siófoki Kórház Fül-Orr-Gége Osztály gyógyító csoportja a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy – mindent mérlegelve – döntsön, és bejegyző nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

Az osztály rendjére vonatkozóan a Házirendben foglaltak a mérvadóak.

### A beavatkozás jellege:

Terápiás jellegű műtéti beavatkozás, mely helyi érzéstelenítésben vagy altatásban történik.

### A beavatkozás célja:

Az arcüregben lévő krónikus vagy akut gyulladás gyógyítása.

Arccsont törés esetén a törés helyreállítása belső rögzítéssel.

**Diagnózis (jelenlegi egészségi állapot magyarul):** .....

**A beavatkozás tervezett időpontja:** .....

### Beavatkozás előtti történések:

Teljes körű kivizsgálás, osztályos felvétel. Műtét előtt altató orvos is megvizsgálja a beteget. Műtéti napon éjjeltől a műtetre készülőnek **TILOS** ennie és innia! Műtét előtt kb. fél órával megkapja az előkészítő, előaltató injekciót, még a kórteremben. Innentől kezdve **TILOS és VESZÉLYES** felkelni.

### Beavatkozás módja:

A száj üregben a felső fogsor felett metszést ejtünk, az arccsontról lágyrészeket letolva, az arcüreg elülső falán nyílást vésünk, majd ezen keresztül a gyulladásos, beteg részeket eltávolítjuk.

Az orron keresztül a középső vagy alsó orrkagyló alatt az orr felé tág arcüregi levezetést biztosítunk. Szükség esetén ballon katétert, vagy jódos tampont helyezünk be.

### Szövődmények:

Általános altatási szövődmények: erről az altatóorvos tájékoztatja Önt.

A műtét lehetséges szövődményei:

- gyógyszerallergia, érzéstelenítő-, altatószere
- fog sérülés, fog kitörés – elvesztés, ajakszél becsípődés
- az előkészítő injekció szövődményei (tályog, ér- és idegsérülés, fájdalmak, hegek)
- utóvérzés (leggyakrabban az első 24 órában fordul elő): ritkán fordul elő, műtét utáni állapotban a vér a légsőbe kerülhet, veszélyes oxigénhiány, fulladás alakulhat ki, újabb műtét válhat szükségessé.
- a pofában kialakult bevérzés eltályogosodhat, a szájon keresztül fertőzés terjedhet az arc lágyrészei közé.
- extrém ritka esetekben műtét során a szemüreg alsó fala is sérülhet, szemmozgási és látás zavarok következhetnek be.

### Beavatkozás utáni történések, várható következmények:

Műtét után még nem lesz teljesen ébren. Előfordulhat aluszékonyság, nyugtalanság-hánykolódás, hányinger, hányás. Ez kellemetlen, de nem ritka velejárója az altatásos műtéteknek. Elképzelhető, hogy a karján, lábán még lesz egy kis csappal ellátott műanyag tű, mely az esetleges infúzió bekötéséhez kell (ha a kanül megtartható nem kell újra megszünni a gyermeket). A legfontosabb, hogy minden ilyen esetben szóljon nővérnek.

Műtétes oldalon az arca erősen megduzzadhat, melynek jegelése szükséges.

Az orrából katéter lóghat ki, melynek eltávolítása majd az orvos feladata lesz, ezért addig vigyázni kell rá.

**Betegtájékoztató és beleegyező lap**

<b>Dokumentum címe:</b>	<b>Nyitott arcüreg feltárási műtét (Luc-Caldwell)</b>		
<b>Változat: 03</b>	<b>Hatályos: 2015.08.04.</b>	<b>2.oldal a(z) 2 oldalból</b>	<b>Módosítás: 2</b>
<b>Dokumentum száma: Bny./FOG./20</b>	<b>Hatályba helyezte: Dr. Czurkó Géza osztályvezető főorvos</b>		

**Mi a teendő beavatkozás után?**

4-6 napos kórházi megfigyelés szükséges, az első két órában szoros nővéri – orvosi felügyelettel. A műtét után, amint az érzéstelenítő hatása megszűnik, fájdalmat érezhet a beteg. Természetesen adunk fájdalomcsillapítót. Önnek csak jeleznie kell, ha igényli. Fájdalomcsillapítás injekció illetve tablettá formájában.

Két óra elteltével lehet inni. **Nagyon fontos**, hogy először csak egy-két kortyot szabad innia, mert a hirtelen sok folyadék hányást provokálhat. Fogat mosni, fürdeni természetesen szabad.

Egy hétig otthon kímélő életmód javasolt. Fizikai munkától még 1 hétig tartózkodjon.

Műtét után 2 hétig vérnyomást emelő tevékenységektől pl. sport, torna, nehéz tárgyak emelése tartózkodni kell. Nem szabad erős kávét, alkoholt inni. Szakorvosi kontroll vizsgálat javasolt.

**Milyen alternatív megoldás lehetséges?**

Ezt helyettesítő alternatív megoldás nincs.

**A műtét elmaradásának következményei:**

Gyulladás esetén a műtét elmaradása a folyamat tovább terjedése következhet be, mely tályogok kialakulását okozhatja mind az arc, mind a szem üregben és környékén.

**Beleegyezési nyilatkozat**

A beavatkozásról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, kérem annak elvégzését.

.....  
tájékoztatót adó orvos neve

.....  
beteg/törvényes képviselő aláírása

(Írástudatlan személynél két tanú jelenlétével kell feljegyezni a beleegyezést.)

Siófok, .....év .....hó .....nap .....óra .....perc

**Elutasító nyilatkozat**

A kezelőorvos részletes felvilágosítása – amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazta – ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....  
tájékoztatót adó orvos neve

.....  
beteg/törvényes képviselő aláírása

1. Tanú: .....  
aláírás

2. Tanú: .....  
aláírás

Siófok, .....év .....hó .....nap .....óra .....perc

Ezen lap egy aláírt példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!