

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Orrvérzés/Epistaxis ellátása electrocauterezéssel (égetés)		
Változat: 03	Hatályos: 2015.08.04.	1.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás: 2
Dokumentum száma: Bny./FOG./26	Hatályba helyezte: Dr. Czurkó Géza osztályvezető főorvos		

Beteg neve: TAJ száma:

Tisztelt Betegünk / Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk, hogy Önnek/gyermekének mielőbbi gyógyulása érdekében az ornyálkahártya electrocauterezésére (égetésére) van szüksége az orrvérzés megszüntetése céljából. A Siófoki Kórház Fül-Orr-Gége Osztály gyógyító csoportja a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy – mindent mérlegelve – döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

A beavatkozás jellege:

Terápiás jellegű beavatkozás (indokolt esetekben altatásban is végezhető eljárás.)

A beavatkozás célja:

Az orrüregi vérzés elállítása.

Diagnózis (jelenlegi egészségi állapot magyarul):

A beavatkozás tervezett időpontja:

Beavatkozás előtti történések:

Az orrüregben lévő véralvadékokat eltávolítjuk, az orrüreget kitisztítjuk. A vérzésforrást lokalizáljuk, gyógyszeres vatta (Novorin, Lidocain, Pantocain) behelyezésével az orr nyálkahártyáját lelohasztjuk, érzéstelenítjük. A nyálkahártya érzéstelenítése miatt gombócot érezhet a torkában, nyelése nehezítetté válhat.

Altatás esetén műtét előtt altató orvos is megvizsgálja a beteget.

Beavatkozás módja:

Unipoláris-egypólusú cauterizálás esetén a beteg keze alá helyezett széles elektródán lép a nagyfrekvenciás áram a testbe. A vérzést érintő cauterfejnél az áram égeti a szövetet.

Bipoláris (kettős) cauterizálásnál a csipesz érintő végei között történik az égetés.

Cauterizálás után a kezelt nyálkahártyát kenőccsel vagy laza tamponnal védjük.

Szövődmények:

Általános altatási szövődmények: erről az altatóorvos tájékoztatja Önt.

A beavatkozás lehetséges szövődményei:

- gyógyszerallergia, érzéstelenítő-, altatószere
- az előkészítő injekció szövődményei (tályog, ér- és idegsérülés, fájdalmak, hegek)
- utóvérzés, ritkán fordul elő, műtét utáni állapotban a vér a légcsőbe kerülhet, veszélyes oxigénhiány, fulladás alakulhat ki. Ritka esetekben előfordulhat, hogy ismételt beavatkozásra vagy orrüreg tamponálásra van szükség.
- extrém esetben vérátömlesztésre kerülhet sor.
- helyi gyulladás, arcüreggyulladás, tályog képződés
- garatsérülés
- orrsővény átlukadása

Beavatkozás utáni történések:

Altatás miatt előfordulhat aluszékonyság, nyugtalanság-hánykolódás, hányinger, hányás. Ez kellemetlen, de nem ritka velejárája az altatásos műtéteknek. Elképzelhető, hogy a karján, lábán még lesz egy kis csappal ellátott műanyag tű, mely az esetleges infúzió bekötéséhez kell (ha a kanül megtartható nem kell újra megszünni). A legfontosabb, hogy minden ilyen esetben szóljon nővérnek.

Vérnyomását rendszeresen ellenőrizzük, rutin laboratóriumi vizsgálatokat végzünk, szükség esetén belgyógyászati konzíliumot kérünk.

Betegtájékoztató és beleegyező lap

Dokumentum címe:	Orrvérzés/Epistaxis ellátása electrocauterizációval (égetés)		
Változat: 03	Hatályos: 2015.08.04.	2.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás: 2
Dokumentum száma: Bny./FOG./26	Hatályba helyezte: Dr. Czurkó Géza osztályvezető főorvos		

Mi a teendő beavatkozás után?

2-4 napos kórházi megfigyelés szükséges, az első két órában szoros nővéri – orvosi felügyelettel. A műtét után, amint az érzéstelenítő hatása megszűnik, fájdalmat érezhet a beteg. Természetesen adunk fájdalomcsillapítót. Önnek csak jeleznie kell, ha igényli. Fájdalomcsillapítás gyermekeknél kúp, felnőtteknél injekció illetve tablettá formájában.

Két óra elteltével lehet inni. Ne kapjon szénsavas italt, csípős – fűszeres ételt. Szívószál használata tilos!

Fürdeni természetesen szabad, **de nem szabad forró vízben, és TILOS HAJAT MOSNI!**

Egy hétig otthon kímélő életmód javasolt, gyermek ne menjen iskolába – óvodába, felnőtt ne dolgozzon. Műtét után 2 hétig vérnyomást emelő tevékenységektől pl. sport, torna, nehéz tárgyak emelése tartózkodni kell. Nem szabad erős kávé, alkoholt inni. Szakorvosi kontroll vizsgálat javasolt.

Ismételt vérzés esetén azonnali gégészeti vizsgálat és ellátás.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

A beavatkozást nem végezzük el.

A beavatkozás elmaradásának következményei:

Az akut vérzés életet veszélyeztető állapot, mely ellátás nélkül akár halállal is végződhet.

Amennyiben a vérzés magától eláll, az ismétlődhet, illetve a kiváltó ok pl. magas vérnyomás szövődményei léphetnek fel.

Beleegyezési nyilatkozat

A beavatkozásról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, kérem annak elvégzését.

.....
tájékoztatót adó orvos neve

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

(Írástudatlan személynél két tanú jelenlétével kell feljegyezni a beleegyezést.)

Siófok,évhónapóraperc

Elutasító nyilatkozat

A kezelőorvos részletes felvilágosítása – amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazta – ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....
tájékoztatót adó orvos neve

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

1. Tanú:
aláírás

2. Tanú:
aláírás

Siófok,évhónapóraperc

Ezen lap egy aláírt példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!