

Betegtájékoztató és beleegyező lap

Dokumentum címe:	Ventillációs tubus behelyezés dobhártyába (Grommet)		
Változat: 03	Hatályos: 2015.08.04.	1.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./FOG./23	Hatályba helyezte: Dr. Czurkó Géza osztályvezető főorvos		

Beteg neve: TAJ száma:

Tisztelt Betegünk / Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk, hogy Önnek/gyermekének mielőbbi gyógyulása érdekében dobhártya bemetszés és ventillációs tubus behelyezése válik szükségessé. A Siófoki Kórház Fül – Orr – Gégészeti Osztály gyógyító csoportja a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy – mindent mérlegelve – döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

A beavatkozás jellege:

Terápiás jellegű beavatkozás.

A beavatkozás célja:

Gennyes vagy savós középfülgyulladás kapcsán, a dobüregben képződött váladék ürülésének elősegítése, a célből, hogy a feszítő fájdalom megszűnjön, illetve az esetleges szövődményeket megelőzzük. A ventillációs tubus behelyezésével a dobüreg tartós szellőzését biztosítjuk.

Diagnózis (jelenlegi egészségi állapot magyarul):**A beavatkozás tervezett időpontja:****Beavatkozás módja:**

A beavatkozás helyi érzéstelenítésben vagy altatásban történhet.

Helyi érzéstelenítés esetén: fájdalomcsillapító (kokain, fenolszármazék, mentol) oldattal átitatott vattát helyezünk a dobhártya felszínére, majd 15-30 perc múlva a dobhártyát kis lándzsával bemetszük. A beavatkozás fájdalom nélkül vagy minimális fájdalmat okozva elvégezhető. Az esetlegesen ürülő váladékot leszívjuk, majd a ventillációs tubust a dobhártyán keletkezett nyílásba illesztjük.

Altatás esetén: a fentieket végezzük helyi érzéstelenítés nélkül.

Szövődmények:

Az előírásnak megfelelő technikával kivitelezett dobhártyabemetszés (paracentesis) szövődménymentes. Nehezen közreműködő felnőtt vagy gyermek eseteiben ritkán, felületesen sérülhet a hallójárat bőre, melyből rövid ideig tartó vérzés következhet be. Stabil fejfogással (asszisztencia) ez kiküszöbölhető. A bemetszés után enyhe fájdalom és fülben nyomásérzés következhet be.

Ritkán a dobhártyabemetszést követheti középfülgyulladás, nem várt allergiás reakció az érzéstelenítőszerre. A bemetszés nem gyógyul be, tartós nyílás marad a dobhártyán, melyet idült középfülgyulladás követhet. Ilyenkor gyógyító fülműtét válik szükségessé. Az érzéstelenítő szerre való túlzott allergiás reakció további kezelést igényelhet.

Nagyon ritkán maradandó halláskárosodás, erős vérzés és egyensúlyozó szervi zavarok következhetnek be.

Szintén nagyon ritkán a ventillációs tubus a dobüregbe kerülhet, melynek eltávolítása esetleg műtétet igényel.

Az altatás esetleges szövődményeiről az altató orvos külön tájékoztatja.

Beavatkozás utáni történések, várható következmények:

A feszítő fájdalom, halláspanasz megszűnik, a hallójáratból több – kevesebb váladék ürülése várható. Bizonyos gyulladásokban az ürülő fülváladék véres, erre a kezelő orvos külön felhívja a figyelmet.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

Konzervatív kezelés (antibiotikum, orrcsepp, lázcsillapító, fülre száraz meleg).

Betegtájékoztató és beleegyző lap

Dokumentum címe:	Ventillációs tubus behelyezés dobhártyába (Grommet)		
Változat: 03	Hatályos: 2015.08.04.	2.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./FOG./23	Hatályba helyezte: Dr. Czurkó Géza osztályvezető főorvos		

Mi a teendő a beavatkozás után?

Fülfolyás esetén száraz, gyakran cserélt pamutvatta, a hallójárat bőrének védelme a kimaródás ellen (babaolaj, zsíros krém segítségével). Fülészeti kontroll az orvos által megadott időpontban. A javasolt gyógyszer szedése.

A beavatkozás után szinte azonnal jól hall a beteg, mely a ventillációs tubus bentléte alatt végig fenn áll. A tubus fél – egy év múlva magától kilökődik, ekkor a hallójáratból fájdalom mentesen eltávolítható. Amíg a tubus a fülben van, víz nem mehet a fülbe, erre minden hajmosásnál, fürdésnél fokozottan figyelni kell. Speciális fül dugó használatával a strandolás megoldható.

A beavatkozás elmaradásának következményei:

1. A dobhártya magától kilyukad (kifakad), a váladék spontán ürül.
2. A halláskárosodás visszafordíthatatlanná válhat.
3. Szövődmények alakulhatnak ki (idült középfül-, belsefül gyulladás, fül mögötti csontüreg gennyes gyulladása, arcidegbénulás, agyhártyagyulladás, agytályog).
A szövődmények megoldása műtéti.

Beleegyzési nyilatkozat

A beavatkozásról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, kérem annak elvégzését.

.....
tájékoztatót adó orvos neve.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

(Írástudatlan személynél két tanú jelenlétével kell feljegyezni a beleegyzést.)

Siófok,évhónapóraperc

Elutasító nyilatkozat

A kezelőorvos részletes felvilágosítása – amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazta – ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....
tájékoztatót adó orvos neve.....
beteg/törvényes képviselő aláírása1. Tanú:
aláírás2. Tanú:
aláírás

Siófok,évhónapóraperc

Ezen lap egy aláírt példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!