

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Laparoszkópos chromohydrotubatio és curettage		
Változat: 03	Hatályos: 2017.05.22.	1. oldal a(z) 3 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./SzN./17	Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos		

Beteg neve: TAJ száma:

Tisztelt Betegünk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy mielőbbi gyógyulása érdekében laparoszkópiás chromohydrotubatio és curettage műtéti beavatkozás válik szükségessé. A Siófoki Kórház Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály gyógyító csoportja a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy – mindent mérlegelve – döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

A beavatkozás jellege:

A laparoszkópia a legkorszerűbb vizsgáló és gyógyító eljárások egyike, melynek révén számos betegségben jelentősen lecsökken a klinikai ápolási idő, egyszerűbbé és gyorsabbá válik a betegség pontos megállapítása és az esetek nagy részében – a hagyományos műtét elvégzése nélkül – a gyógyítása is. Műtét kapcsán lehetővé válik a petevezetőinek festékanyaggal történő átfűvése (chromohydrotubatio), átjárhatóságának megállapítása. Mindezek következtében a beteg műtét utáni fájdalmai minimálisak, és a munkaképesség diagnosztikus beavatkozás után pár nap, operatív beavatkozás után pedig egy-két hét után helyreáll. A kórházi ápolás ideje is rövidül.

Diagnózis (jelenlegi egészségi állapot magyarul).....

A beavatkozás tervezett időpontja:

A beavatkozás célja:

Laparoszkópos chromohydrotubációt szélszerű elvégezni bizonytalan eredetű sterilitás esetén, mely által megtudjuk állapítani belső nemi szerveinek esetleges fejlődési rendellenességét, olyan elváltozásait, melyek a teherbeesés esélyeit rontják. Szintén áttudjuk nézni a kismednce egyéb szerveit is. Bizonyos elváltozásokat a műtét kapcsán meg is tudunk szüntetni, gyógyítani.

Nem javasolt elvégezni keringési és légzési elégtelenségben, vérzékenységben, kiterjedt akut hashártyagyulladásnál, bélelzáródás gyanújakor, kiterjedt daganat, rosszindulatúság esetén. Megfontolandó elvégezni többszörös előzetes műtétek után, előzetes hashártyagyulladás után, súlyos szívbetegségben és keringési rendellenességben.

Hogyan történik a beavatkozás?

A módszer lényege az, hogy az altatóorvos döntése alapján az Ön állapotának legmegfelelőbb érzéstelenítésben /melyről külön nyomtatványon rendelkezik/, általában mély altatásban és kiterjedt lazításban, fejreállított helyzetben a köldökénél kb. 1 cm hosszúságú metszést végzünk, amelyen keresztül bevezetjük a hasán belüli látást és tájékozódást biztosító optikai eszközt, a laparoszkópot. A hasüreget széndioxid gázzal feltöltjük, amely a hasfalat megemeli és a beleket a has felső részébe nyomja a kismedencéből. Ezáltal lehetővé válik a méh, petevezetők és petefészkek megfigyelése és szükség esetén operációja. A műtéti beavatkozáshoz még további eszközök /fogó, olló, elektromos kés, lézer, stb./ bevezetése is szükséges, amely az alhasban rendszerint kétoldalt történik fél-fél cm-es metszésből. Ha hüvelyét feltárva a méhszájába olyan eszközt vezetünk, melyen át tudjuk felfecskendezni a festékanyagot. A műtét kapcsán méhüri curettage is végzünk, az így kapott méhnyálkahártya csíkok szövettani vizsgálata céljából. A hasban találkozhatunk olyan situációval, elváltozással, esetleg történhet olyan szövődmény a curettage kapcsán is, mely miatt a has megnyitására kényszerülünk a további ellátás céljából.

Mik a beavatkozás esetleges szövődményei?

Szövődmények gyakoriságát emelhetik társbetegségek, élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, családban gyakrabban előforduló betegségek, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei. Ezekről feltétlenül tájékoztassa orvosát

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Laparoszkópos chromohydrotubatio és curettage		
Változat: 03	Hatályos: 2017.05.22.	2.oldal a(z) 3 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./SzN./17	Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos		

Szövődmények adódhatnak behatolásakor a környező belek, erek, idegek sérüléséből, valamint széndioxid feltöltéskor annak vérbe jutásakor embolizációt okozva. Tekintve, hogy a műtét területe a kismedence, ahol idegek, belek, nagy erek, húgyvezetők, húgyhólyag, méh és petefészkek egymással szoros közelségben és összeköttetésben vannak, ezért műtét kapcsán ezek bármelyike sérülhet. Előzőekben már említett hüvely felőli manipulációk kapcsán sérülhet méhszája és méhe is. Ezen sérüléseket gyakran csak has megnyitásával tudjuk ellátni. Műtét közben előforduló erős vérzések esetén esetlegesen vérkészítmények beadására is kényszerülhetünk. Ezen készítmények szigorú szűréseken, teszteken esnek át beadásuk előtt.

Műtét utáni történések:

Műtétet követően az osztályon fokozott megfigyelésben részesül. A széndioxid feltöltésből kevés gáz maradhat vissza a belek között, mely eleinte felkeléskor rekeszalatti nyomásérzékenységet, csuklást, rossz érzetet okozhat. Tekintettel a kis sebzésre lázas állapot nagyon ritkán fordul elő, sebgyógyulási zavar, vérömleny, váladékozás alig alakul ki.

Festékanyag használata miatt hüvelybemenete, hüvelye elszíneződhet és pár napig a vizelete is festenyzett lehet. A sebzéseknél öltések lehetnek, melyeket egy héttel a műtét után távolítunk el.

Várható következmények:

Műtét után gyors a gyógyulása kivéve, ha súlyosabb szövődmény lépett fel. Seb fájdalom gyorsan szűnik, hüvelyéből a segédeszközök használata miatt eleinte kevés vérezgetése lehet, mely pár napon belül szűnik. A ciklusa nem fog változni, sőt betegsége szüntével amennyiben az rendellenes volt, normalizálódhat. Szexuális életét a műtét nem befolyásolja. Teherbeesési és kihordási esélyeiről műtét után tájékoztatjuk.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

Az előzőekben már említettük, hogy felajánlott laparoszkópos beavatkozásunk a tudomány jelen állása szerint a legkorszerűbb beavatkozások egyike. Ez ellenére tudja, hogy vannak más eljárások is, melyekkel tervezett műtétét elvégezhetjük. Ezen eljárások vagy bonyolultabbak, vagy veszélyesebbek, vagy kevesebb információval bírnak, vagy félmegoldást jelentenek. Ezek: has felvágásával járó műtétek, feltöltéses röntgenvizsgálatok, festékanyagossal feltöltéses vizsgálat hasúr punkciójával egybekötve, gyógyszeres kezelések, népi gyógymódok.

Mi a teendő a beavatkozás után?

A műtét kapcsán esetlegesen eltávolított szöveteket szövettani vizsgálatra küldjük, mely eredményéért a zárójelentés egyik példányával két hét múlva osztályunk irodáján jelentkezzen. Ezen eredményt az orvosával is beszélje meg. Műtétet követő 6 hét múlva kontroll vizsgálaton jelentkezzen, panasz esetén azonnal. A kontroll vizsgálatig kímélő életmód, nemi élet tilalom javasolt. Amennyiben lombikbébi programra irányítjuk, oda zárójelentésünket is vigye magával.

Műtét elmaradásának következményei:

Tudjuk, hogy bizonyos szövődmények rémítően hatnak, de döntését az vezérelje, hogy az Ön gyógyulása, életkilátásának javítása érdekében történik minden, és sokkal nagyobb haszon várható, mint amekkora a kockázat. Amennyiben a felajánlott műtétet nem végezhetjük el, az észlelt elváltozások tovább fejlődhetnek, terjedhetnek. Ezek fájdalomérzet fokozódásával, teherbeesési esélyek csökkenésével, vagy terhesség kiviselésének zavaraival járhatnak. Amennyiben teherbeesési problémái vannak, az esetleges későbbi mesterséges megtermékenyítési programba ezen műtét nélkül nem is léphet be

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Laparoszkópos chromohydrotubatió és curettage		
Változat: 03	Hatályos: 2017.05.22.	3.oldal a(z) 3 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./SzN./17	Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos		

Beleegyezési nyilatkozat

A laparoszkópiás chromohydrotubatió és curettage műtéti beavatkozásról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, kérem annak elvégzését.

.....
a felvilágosítást végző személy

.....
...beteg/törvényes képviselő aláírása

Siófok,..... év..... hó..... nap..... óra..... perc

Elutasító nyilatkozat

A kezelőorvos részletes felvilágosítása – amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazta – ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....
a felvilágosítást végző személy

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

1.Tanú:.....
aláírás

2.Tanú:.....
aláírás

Siófok,..... év..... hó..... nap..... óra..... perc

Ezen lap egy aláírt példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!