

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Lash (méhnyak-záró) műtét		
Változat: 03	Hatályos: 2017.05.22.	1.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./SzN./18	Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos		

Beteg neve: TAJ száma:

Tisztelt Betegünk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy mielőbbi gyógyulása érdekében Lash (méhnyak-záró) műtėti beavatkozás elvégzése válik szükségessé. A Siófoki Kórház Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály gyógyító csoportja a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy – mindent mérlegelve – döntsön és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

A beavatkozás jellege:

Profilaktikus – megelőző méhnyak-záró műtét, melyet nem terhes állapotban végzünk.

Diagnózis (jelenlegi egészségi állapot magyarul).....

A beavatkozás tervezett időpontja:

A beavatkozás célja:

Műtét elvégzése akkor indokolt, amikor az előző terhesség (terhességek) során méhnyak-záró műtét ellenére a méhnyak elégtelenség jellemző tünetei kíséretében a terhesség közepidős vetéléssel, éretlen, illetve koraszüléssel végződik, két vagy több gravititás. A műtét javallata a kórelőzményen és a cervikográfiás (a belső méhszáj állapotát jelző) röntgen vizsgálati, vagy ultrahang leleten alapszik.

Hogyan történik a beavatkozás?

A Lash műtét lényege kellő kivizsgálás után az altatóorvos döntése alapján az Ön állapotának megfelelő érzéstelenítésben a hüvely feltárása és fertőtlenítése után a méhszáj elülső falán U alakú metszést ejtünk, és a hólyag alatt mérsékelt felpreparálásában szabaddá tesszük a feltételezett defektus helyét. A heges szövetet szikével eltávolítjuk, majd csomós haránt irányú öltésekkel a nyakcsatornát beszűkítjük. A hüvelyfal lebenyt vékony ket-göt (felszívódó) öltésekkel az eredeti helyére visszavarrjuk.

Mik a beavatkozás esetleges szövődményei?

Műtétet követően utóvérzés jelentkezhet, nagyon ritkán, de előfordulhat a műtėti terület elfertőződése.

Várható következmények:

Műtét után gyors a gyógyulás. Amennyiben szövődménymentes és eredményes a műtét a későbbiekben élő érett újszülött születése várható.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

Amennyiben a műtét elmarad, a későbbiekben terhesség alatt elvégzett méhnyak-záró műtét jön szóba, melynek eredményessége nem éri el a Lash műtétét.

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Lash (méhnyak-záró) műtét		
Változat: 03	Hatályos: 2017.05.22.	2.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./SzN./18	Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos		

Mi a beavatkozás ellenjavallata?

Vérzési rendellenesség, hüvelyi fertőzés, vagy gyulladás, a méhnyak rákmegelőző vagy rosszindulatú elváltozása.

Mi a teendő beavatkozás után:

Kórházi bent fekvést követően pár napig színes váladékozása lehet. 4 hétig házasélet mentesség, 6 hét múlva nőgyógyászati kontroll javasolt.

Műtét elmaradásának következményei:

Tudjuk, hogy bizonyos szövödmények rémítően hatnak, de döntését az vezérelje, hogy az Ön gyógyulása, leendő magzata életkilátásának javítása érdekében történik a felajánlott műtét. Amennyiben a felajánlott műtétet nem végezhetjük el, ismételt középido vetelés, éretlen, illetve koraszülés zajlódhat le következő terhességében.

Beleegyezési nyilatkozat

A Lash (méhnyak-záró) műtéti beavatkozásról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, kérem annak elvégzését.

.....
a felvilágosítást végző személy

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

Siófok, év..... hó..... nap..... óra..... perc

Elutasító nyilatkozat

A kezelőorvos részletes felvilágosítása – amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazta – ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....
a felvilágosítást végző személy

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

1.Tanú:.....
aláírás

2.Tanú:.....
aláírás

Siófok, év..... hó..... nap..... óra..... perc

Ezen lap egy aláírt példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!