

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
<b>Dokumentum címe:</b>	<b>Méhtest eltávolítás</b>		
<b>Változat: 03</b>	<b>Hatályos: 2017.05.22.</b>	<b>1.oldal a(z) 2 oldalból</b>	<b>Módosítás 2</b>
<b>Dokumentum száma: Bny./SzN./20</b>	<b>Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos</b>		

Beteg neve: ..... TAJ száma: .....

### Tisztelt Betegünk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy mielőbbi gyógyulása érdekében méhtest eltávolítása műtéti beavatkozás válik szükségessé. A Siófoki Kórház Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály gyógyító csoportja a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy – mindent mérlegelve – döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

#### A beavatkozás jellege:

A mindennapi szóhasználatban a méheltávolítás jelentheti a méhtest eltávolítását ( a méhnyak megmarad ) és a méh teljes kiirtását. Néhány évtizeden keresztül a méhnyakat csak ritkán hagytuk vissza, mivel abból esetlegesen a méhnyak-csonk rosszindulatú daganata kifejlődhet. A hüvelytükrözés és a rákszűrés mind gyakoribb és megbízhatóbb alkalmazásával a méhnyak-csonk rosszindulatú daganatának veszélye minimálisra csökkenhet, ezért újra egyre többször végezzük a méhtest izolált eltávolítását.

**Diagnózis (jelenlegi egészségi állapot magyarul).....**

**A beavatkozás tervezett időpontja: .....**

#### A beavatkozás célja:

Akkor végezzük a fenti műtétet, amikor a beteg súlyos általános állapota miatt a műtétet igyekszünk hamarabb befejezni, vagy ha az anatómiai helyzet (összenövések, daganatos vagy gyulladós szövetben való preparálási nehézség, nagyfokú elhízás, stb.) kedvezőtlen a teljes méheltávolításhoz.

#### Hogyan történik a beavatkozás?

Az altatóorvos által javasolt érzéstelenítési módban a megfelelő műtéti előkészítést követően, a várható elváltozás jellegének és az Ön adottságainak megfelelően vagy alhasi középmetasztézis, vagy a szeméremcsont feletti redőben harántmetasztézis („bikini” metasztézis) ejtve nyitjuk meg a hasát. A műtét jellegét műtét közben döntjük el. A beavatkozás körülbelül 1-2 órát vesz igénybe.

#### Mik a beavatkozás esetleges szövődményei?

Szövődmények gyakoriságát emelhetik társbetegségek, élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, családban gyakrabban előforduló betegségek, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei. Ezekről feltétlenül tájékoztassa orvosát.

Műtét alatt hasi szerv (húgyhólyag, húgyvezeték, bél) sérülése, melyek ellátása azonnal, még a műtét alatt megtörténik. Műtét alatt kialakulhat olyan vérzés, mely miatt vérkészítmény adására is kényszerülhetünk. Hasfalát rétegesen zárjuk, mely szövetek között kialakulhat vér- vagy folyadékgyülem. Ezek lebocsátására kis gumicsövet hagyunk a hasfalban. Fertőzések, sebgyógyulási problémák, vérszegénység, tartósabb ágyhozakötöttség esetén tüdőgyulladás, esetleg vérrögösödés is előfordulhat. Az esetleges szövődmények elhárítására, ellátására és gyógyítására osztályunkon a feltételek biztosítva vannak.

#### Műtét utáni történések:

Műtétet követően 24 órás szubintenzív megfigyelésre az őrzőszobába kerül, ahol műszerekkel vér és vizelet vizsgálatokkal követjük állapotát. Állandó vénatűjén keresztül pótoljuk a folyadékvesztéseket, adjuk a gyógyszereket. Vizeletét minimum 24 órán át katéteren vezetjük le. Inni csak kellő éber állapotban kap, enni pedig csak a kellőképpen beindult bélműködés után. A műtét után belei renyhébben működnek, ha gyógyszerekre nem reagálnak, nagyon ritkán el is záródhatnak, mely miatt esetleges korrekciós műtetre is szükség lehet. Műtét után felléphet lázas állapot, amelyeket gyógyszerekkel csillapítunk.

Panaszmentesség esetén, varratszedést követően a 7.napon otthonába bocsátjuk

<b>Betegtájékoztató és beleegyező lap</b>			
<b>Dokumentum címe:</b>	<b>Méhtest eltávolítás</b>		
<b>Változat: 03</b>	<b>Hatályos: 2017.05.22.</b>	<b>2.oldal a(z) 2 oldalból</b>	<b>Módosítás 2</b>
<b>Dokumentum száma: Bny./SzN./20</b>	<b>Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos</b>		

**Várható következmények:**

A műtét eredményeként a visszamaradó hüvely alkalmas közösülésre, de továbbiakban havi vérzés és fogamzás (terhesség) nem várható. A visszahagyott méhnyak miatt az évenkénti rákszűrés nagyon fontos! Eleinte hasúri fájdalmi lesznek, melyeket csillapítunk, idővel ezek enyhülnek, szűnnek. Kisebb-nagyobb letapadások alakulhatnak ki a hasban, amelyek időszakos fájdalommal, front érzékenységgel járhatnak.

**Milyen alternatív megoldás lehetséges?**

Nem lehetséges.

**Mi a teendő a beavatkozás után?**

A műtét kapcsán esetlegesen eltávolított szöveteket szövettani vizsgálatra küldjük, mely eredményéért a zárójelentés egyik példányával két hét múlva osztályunk irodáján jelentkezzen. Ezen eredményt az orvosával is beszélje meg. Műtétet követő 6 hét múlva kontroll vizsgálaton jelentkezzen, panasz esetén azonnal. A kontroll vizsgálatig kímélő életmód, nemi élet tilalom javasolt.

**Műtét elmaradásának következményei:**

Műtét elmaradásának következményeként fennálló panaszai tovább fokozódhatnak, további egészségromlás következhet be, esetleges rosszindulatú elfajulás is létrejöhet.

**Beleegyezési nyilatkozat**

A méhtest eltávolítás műtéti beavatkozásról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, kérem annak elvégzését.

.....  
a felvilágosítást végző személy

.....  
beteg/törvényes képviselő aláírása

Siófok, ..... év..... hó..... nap..... óra.....perc

**Elutasító nyilatkozat**

A kezelőorvos részletes felvilágosítása – amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazta – ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....  
a felvilágosítást végző személy

.....  
beteg/törvényes képviselő aláírása

1.Tanú:.....  
aláírás

2.Tanú:.....  
aláírás

Siófok, ..... év..... hó..... nap..... óra.....perc

Ezen lap egy aláírt példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!