

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Szerklázs (méhnyak-záró) műtét		
Változat: 03	Hatályos: 2017.05.22.	1.oldal a(z) 3 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./SzN./02	Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos		

Beteg neve: TAJ száma:

Tisztelt Betegünk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy mielőbbi gyógyulása érdekében Szerklázs (méhnyak-záró) műtėti beavatkozás válik szükségessé. A Siófoki Kórház Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály gyógyító csoportja a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy – mindent mérlegelve – döntsön és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

A beavatkozás jellege:

A terhesség során észlelt méhnyak-elégtelenség műtėti megoldása. Végzése a terhesség 16. és 30. hete között jön szóba.

Diagnózis (jelenlegi egészségi állapot magyarul).....

A beavatkozás tervezett időpontja:

A beavatkozás célja:

A méhnyak-záró műtét lényege, hogy megakadályozzuk a méhnyak-elégtelenség következményeként lezajló középidős vetélést, éretlen, illetve koraszülést.

Műtėti javallat lehet profilaktikus (megelőző) és terápiás.

Profilaktikus javallat alapján akkor kerül sor ilyen műtétre, amikor a kórelőzményben egy vagy több típusos lefolyású középidő vetélés, éretlen, illetve koraszülés szerepel.

Terápiás javallatú a műtét amikor a nyakcsatorna nyitott, a belső méhszáj tátong.

Műtét feltételei: - élő magzat, álló burok, görcs és vérzés nélküli állapot – megfelelő hüvely tisztasági fok és baktérium-mentesség.

Hogyan történik a beavatkozás?

Műtét lényege, hogy kellő kivizsgálás után az altatóorvos döntése alapján az Ön állapotának megfelelő érzéstelenítésben a hüvely feltárása és fertőtlenítése után kifogjuk a méhszáj mellső és hátsó ajkát és a belső méhszáj magasságában felszívódó ket-göt, vagy műanyag, dohányzacskó öltéssel zárjuk a belső méhszájat.

Mik a beavatkozás esetleges szövődményei?

Műtétet követően kontrakciók (görcsök), vérzés jelentkezhet, a Szerklázs fonal feszül és azt el kell távolítani, ugyanis a feszülő fonal a méhnyak mechanikus feszülése folytán a görcsök erősödését okozhatja. A műtét kivitelezése során a burok megrepedhet, így középidős vetélés, éretlen, illetve koraszülés zajlódhat le. Nagyon ritkán de előfordulhat méhen belüli fertőzés, amely szintén a terhesség megszakadásával járhat.

Megfelelő feltételek és javallatok alapján elvégzett műtét esetén a szövődmények gyakorisága ezrelékes nagyságrendű.

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Szerklázs (méhnyak-záró) műtét		
Változat: 03	Hatályos: 2017.05.22.	2.oldal a(z) 3 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./SzN./02	Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos		

Műtét utáni történések:

A kismama műtétet követően az osztályon fokozott megfigyelésben részesül. 2 hét panaszmentesség után otthonába távozhat. A méhszájba behelyezett műanyagöltést a terhesség 37. hetében eltávolítjuk. Műtét után hosszabb ideig indokolt a terhesség megtartását elősegítő gyógyszeres kezelés.

Várható következmények:

Műtét után gyors a gyógyulás, amennyiben a terhesség lefolyása a későbbiekben zavartalan, úgy élő érett újszülött születése várható.

Milyen alternatív megoldás lehetséges:

Több hónapos kórházi bennfekvés, gyógyszeresedés lehet még megoldás, de sokszor még így sem védhető ki a középidős vetélés, éretlen, illetve koraszülés.

Mi a beavatkozás ellenjavallata:

Hüvely, nyakcsatorna, tartós bakteriális fertőzések, hüvelybe előboltosuló, feszülő burok, belső méhszájon tapadó lepény.

Mi a teendő beavatkozás után:

Kórházi bennfekvést követően a kismama a területileg illetékes terhesnőcsadóban, panaszok esetén – alhasi görcsök, vérzés, magzatvíz szivárgás – azonnal kórházi felvételre jelentkeznek.

Műtét elmaradásának következményei:

Tudjuk, hogy bizonyos szövődmények rémítően hatnak, de döntését az vezérelje, hogy az Ön gyógyulása, magzata életkilátásának javítása érdekében történik a felajánlott műtét. Amennyiben a felajánlott műtétet nem végezhetjük el, középidős vetélés, éretlen, illetve koraszülés zajlódhat le. A műtétnek mindenképpen nagyobb az előnye, mint az elmaradásával járó kockázat.

Beleegyező nyilatkozat

A szerklázs (méhnyakzáró) műtéti beavatkozásról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, kérem annak elvégzését.

.....
a felvilágosítást végző személy

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

Siófok,év.....hó.....nap.....óra.....perc

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Szerklázs (méhnyak-záró) műtét		
Változat: 03	Hatályos: 2017.05.22.	3.oldal a(z) 3 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./SzN./02	Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos		

Elutasító nyilatkozat:

A kezelőorvos részletes felvilágosítása – amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazta – ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....
a felvilágosítást végző személy

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

1.Tanú:.....
aláírás

2.Tanú:.....
aláírás

Siófok,év.....hó.....nap.....óra.....perc

Ezen lap egy aláírt példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!