

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Sirbu műtét (a méh üregében elhelyezkedő sővény eltávolítása)		
Változat: 03	Hatályos: 2017.05.22.	1.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./SzN./25	Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos		

Beteg neve: TAJ száma:

Tisztelt Betegünk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy mielőbbi gyógyulása érdekében Sirbu műtėti beavatkozás válik szükségessé. A Siófoki Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztály gyógyító csoportja a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy – mindent mérlegelve – döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

A beavatkozás jellege:

Terápiás nőgyógyászati műtét.

Diagnózis (jelenlegi egészségi állapot magyarul).....

A beavatkozás tervezett időpontja:

A beavatkozás célja:

A méhürt teljesen, vagy részlegesen kettéosztó, a teherbe esést akadályozó, illetve a szokványos vetélések okaként szereplő válaszfal eltávolítása. Kétszarvú, illetve dupla méhtest (uterus duplex) fejlődési rendellenesség megoldása.

Hogyan történik a beavatkozás?

A beavatkozás az altatóorvos által javasolt érzéstelenítési módban a megfelelő műtėti előkészítést követően az Ön adottságainak megfelelően vagy alhasi középmetaszt, vagy a szeméremcsont feletti redőben harántmetaszt („bikini”) metaszt ejtve nyitjuk meg a hasat. A műtétet a menstruáció utáni napokra időzítjük, ilyenkor kisebb a vérvesztés és elkerülhető a fel nem ismert koraterhesség lehetősége is.

A műtét során a méhet megnyitjuk, a sővényt eltávolítjuk, a méh ürét drenáljuk, majd a méh eredeti, anatómiai állapotát helyreállítjuk.

Mik a beavatkozás esetleges szövődményei?

Szövődmények gyakoriságát emelhetik társbetegségek, élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, családban gyakrabban előforduló betegségek, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei. Ezekről feltétlenül tájékoztassa orvosát. Leggyakoribb szövődmény az utóvérzés, összenövés a méh üregén belül esetleges gyulladást követően. Ritkán előfordulhat hegsetválás.

Műtét utáni történések:

24 órás szubintenzív megfigyelés melyre a műtét után örzőszobába kerül, ahol műszerekkel vér – és vizeletvizsgálatokkal követjük állapotát. Állandó vénatűjén keresztül történik a folyadékpótlás és a gyógyszerek adása. Vizeletét minimum 24 órán át katéteren vezetjük le. Inni csak éber állapotban kap, enni pedig csak a kellőképpen beindult bélműködés után. A műtét után belei renyhébben működnek, ha gyógyszerekre nem reagálnak, nagyon ritkán el is záródhatnak, mely miatt esetleges korrekciós műtétre is szükség lehet. Műtét után felléphet lázas állapot, amelyet gyógyszerekkel csillapítunk.

Panaszmentesség esetén a varratszedést és a méhüri drén eltávolítását követően a hetedik napon otthonába bocsátjuk.

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Sirbu műtét (a méh üregében elhelyezkedő sővény eltávolítása)		
Változat: 03	Hatályos: 2017.05.22.	2.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./SzN./25	Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos		

Várható következmények:

Eleinte alhasi fájdalmak lesznek, melyeket csillapítunk. Idővel ezek enyhülnek, szűnnek. Kisebb-nagyobb letapadások alakulhatnak ki a hasában, melyek időszakos fájdalommal, frontérzékenységgel járhatnak. A meddőségének hátterében meghúzódó méhüri sövény eltávolítása után sikeres terhesség jöhet létre.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

Laparoszkopiával, vagy az ultrahang technikával kombinált operatív hiszteroszkópia. Megjegyzendő, hogy az operatív hiszteroszkópiával (méhüregi tükrözéssel történő sövény-eltávolítás) nem mindig sikerül a sövény maradéktalan eltávolítása.

Mi a teendő a beavatkozás után?

Műtétet követően 6 hétig kímélő életmód, ülőfürdő és nemi élet tilalom javasolt. 6 hét múlva kontroll vizsgálaton jelentkezzen, panasz esetén azonnal. A műtétet követően, a méhüri összenövések megakadályozására, átmenti időre méhen belüli fogamzásgátló eszköz (IUD, „spirál”) felhelyezése javasolt a méhüri drén eltávolítása után.

Műtét elmaradásának következményei:

A műtét elmaradásának következményeként fennálló panaszai tovább fokozódhatnak, a teherbe esésének esélye csökken.

Beleegyezési nyilatkozat

A Sirbu műtétről a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, kérem annak elvégzését.

.....
a felvilágosítást végző személy

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

Siófok, év..... hó..... nap..... óra..... perc

Elutasító nyilatkozat

A kezelőorvos részletes felvilágosítása – amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazta – ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....
a felvilágosítást végző személy

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

1.Tanú:.....
aláírás

2.Tanú:.....
aláírás

Siófok, év..... hó..... nap..... óra..... perc

Ezen lap egy aláírt példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!