

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Alsó és felső végtag phlebographiához /A végtag vénáinak jódtartalmú kontrasztanyaggal való feltöltése/		
Változat: 02	Hatályos: 2014.09.04.	1.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás 1
Dokumentum száma: Bny./R./02	Hatályba helyezte: Dr. Puskás Tamás osztályvezető főorvos		

Beteg neve:..... TAJ szám:

Tisztelt Betegünk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy mielőbbi gyógyulása érdekében kontrasztanyag vizsgálatot kell végezni, mivel ez a diagnosztikai módszer jelentősen segíti az Ön betegségének megállapítását és kezelését. A Siófoki Kórház Radiológia Osztályának gyógyító csoportja a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy mindent mérlegelve döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

Alsó- és felső végtag phlebographia

/A végtag vénáinak intravénásan adott jódtartalmú kontrasztanyaggal való feltöltése/

Az érpályába juttatott jódtartalmú kontrasztanyag segítségével ábrázoljuk a végtag vénás rendszerét.

Miért van szükség a vizsgálatra?

A vizsgálat a vénás elkülönítő diagnosztikához – trombózis, trombózis utáni állapot igazolása, visszerek ábrázolása, esetlegesen lábszárfekély környezetében lévő kóros vénák kimutatása, tisztázatlan eredetű végtagduzzanat – szükséges.

Hogyan kell a betegnek felkészülni a vizsgálatra?

A vizsgálat előtt végezze el ürítési szükségleteit.

Hogyan történik a vizsgálat?

Alsó végtag phlebographiánál a beteg boka és térd fölött leszorított lábbal, ülő testhelyzetben van, lábháti véna kanülálása után jódtartalmú kontrasztanyagot adunk be, majd a vizsgálatot hanyatt fekvő helyzetben folytatjuk, szükség szerint az alsó végtagot oldalra elfordítva, a kontrasztanyag folyamatos adása közben röntgenfelvételeket készítünk. Felső végtag phlebographiánál háton fekvő helyzetben csukló fölött leszorítva, kézfej vénába adjuk a kontrasztanyagot, és közben röntgenfelvételeket készítünk.

A vizsgálat esetleges szövődménye

Kontrasztanyag érzékenység esetén, melynek előfordulása rendkívül ritka, bőrpír, verejtékezés, csalánkiütés, hányinger, hányás, súlyosabb esetben gégevizényő. A szövődmények elhárítására felkészültünk.

Mi a teendő a vizsgálat után?

A vizsgálat után pihenés javasolt. Szokatlan panasz esetén forduljon az Önt vizsgáló orvoshoz, szakdolgozóhoz.

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Alsó és felső végtag phlebographiához /A végtag vénáinak jódtartalmú kontrasztanyaggal való feltöltése/		
Változat: 02	Hatályos: 2014.09.04.	2.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás 1
Dokumentum száma: Bny./R./02	Hatályba helyezte: Dr. Puskás Tamás osztályvezető főorvos		

Milyen következménye lehet, ha elmarad a vizsgálat?

A vizsgálat elmaradása esetén a pontos diagnózis felállítása akadályba ütközik, ami a kezelés elkezdését hátráltatja.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

A vizsgálatot helyettesítő lehetséges módszer: color Doppler ultrahang vizsgálat, de némely esetben a két vizsgálat eredménye egymást kiegészíti.

Beleegyezési nyilatkozat

A betegtájékoztató elolvasása és szóbeli tájékoztatás után, melyet megértettem a javasolt vizsgálat elvégzését kérem:

.....
felvilágosítást végző személy

.....
beteg / törvényes képviselő

Siófok, év..... hó..... nap..... óra..... perc

Elutasítás

A kezelőorvos részletes felvilágosítása – mely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazza – ellenére a vizsgálat elvégzését megtagadom.

.....
felvilágosítást végző személy

.....
beteg / törvényes képviselő

1. Tanú:.....
aláírás

2. Tanú:.....
aláírás

Siófok, év..... hó..... nap..... óra..... perc

Ezen lap egy aláírt példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!