

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Kolpoperineorráfia (hüvely plasztika)		
Változat: 03	Hatályos: 2017.05.22.	1.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./SzN./09	Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos		

Beteg neve: TAJ száma:

Tisztelt Betegünk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy mielőbbi gyógyulása érdekében hüvely plasztika műtéti beavatkozás válik szükségessé. A Siófoki Kórház Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály gyógyító csoportja a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy – mindent mérlegelve – döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

A beavatkozás jellege:

A hüvelyfalak süllyedése és vizelettartási problémák miatt végzett hüvelyi, nőgyógyászati terápia műtéti beavatkozás.

Diagnózis (jelenlegi egészségi állapot magyarul).....

A beavatkozás tervezett időpontja:

A beavatkozás célja:

A hüvelyfalak közel eredeti helyzetének helyreállítása, valamint a vizelettartási problémák megoldása.

Hogyan történik a beavatkozás?

A beavatkozást az altató orvos által kiválasztott érzéstelenítési módban végezzük. A műtét előtt kivizsgálást követően a beavatkozást megelőző napon beöntés segítségével a végbélet kitisztítjuk és hüvelyöblítést végzünk. A műtét során a lesüllyedt mellső és hátsó hüvelyfalat szűkítjük és úgy megemeljük, hogy a hólyag és a végbél kedvező helyzetbe kerüljön.

Mik a beavatkozás esetleges szövődményei?

A szövődmények gyakoriságát emelhetik bizonyos alapbetegségek, élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, családban gyakrabban előforduló betegségek, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei. Ezekről feltétlenül tájékoztassa orvosát.

Utóvérzés, vérömleny, vérzés a húgyhólyagból, sipolyképződés, sebszétválás, vizeletürítési zavarok, hólyag vagy végbélsérülés.

Ezeknek az esetleges, de ritka szövődményeknek az ellátására, gyógyítására megfelelő felkészültséggel rendelkezünk.

Műtét utáni történések:

Műtét után enyhe, alhasi fájdalom és kisfokú vérzés lehetséges, amely fokozatosan megszűnik. A műtétnél felhelyezett állandó hólyag katétert 24 óra múlva eltávolítjuk. Panaszmentesség esetén 5 nap múlva hagyhatja el osztályunkat.

Várható következmények:

Panaszai az évek során kiújulhatnak.

Betegtájékoztató és beleegyző lap			
Dokumentum címe:	Kolpoperineorráfia (hüvely plasztika)		
Változat: 03	Hatályos: 2017.05.22.	2.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./SzN./09	Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos		

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

Fiatalabb korban hüvelyi torna. Idős korban, mikor műtéti beavatkozás ellenjavalt, történhet ún. Mayo gyűrű felhelyezése. Kis anatómiai elváltozás esetén gyógyszeres kezelés jöhet szóba. A fenti módszerek egyike sem éri el a műtéti beavatkozás hatékonyságát.

Mi a teendő a beavatkozás után?

Műtétől számított 6 hétig kímélő életmód, majd fokozatos terhelés, a házaselet mellőzése, a gátseb kamillás lemosása és rendszeres, óvatos kamillás hüvelyöblítés javasolt.
Műtétet követő 6 hét múlva kontroll vizsgálaton jelentkezzen, panasz esetén azonnal.

Műtét elmaradásának következményei:

Vizelettartási problémái fokozódnak, a legrosszabb esetben bekövetkezhet a hüvely teljes kifordulása a méhével együtt.

Beleegyezési nyilatkozat

A hüvelyi plasztika műtéti beavatkozásról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyzem, kérem annak elvégzését.

.....
a felvilágosítást végző személy

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

Siófok, év..... hó..... nap..... óra..... perc

Elutasító nyilatkozat

A kezelőorvos részletes felvilágosítása – amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazta – ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....
a felvilágosítást végző személy

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

1.Tanú:.....
aláírás

2.Tanú:.....
aláírás

Siófok, év..... hó..... nap..... óra..... perc

Ezen lap egy aláírt példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!