

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
<b>Dokumentum címe:</b>	<b>Kolpoklézis mediána (hüvelyzáró műtét)</b>		
<b>Változat: 03</b>	<b>Hatályos: 2017.05.22.</b>	<b>1.oldal a(z) 2 oldalból</b>	<b>Módosítás 2</b>
<b>Dokumentum száma: Bny./SzN./14</b>	<b>Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos</b>		

Beteg neve: ..... TAJ száma: .....

### Tisztelt Betegünk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy mielőbbi gyógyulása érdekében kolpoklézis mediána műtéti beavatkozás válik szükségessé. A Siófoki Kórház Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály gyógyító csoportja a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy – mindent mérlegelve – döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

#### A beavatkozás jellege:

Hüvelyi, terápiás nőgyógyászati, jellegű beavatkozás.

**Diagnózis (jelenlegi egészségi állapot magyarul)**.....

**A beavatkozás tervezett időpontja:** .....

#### A beavatkozás célja:

Méh-előesés és a hüvely előesés megszüntetése.

#### Hogyan történik a beavatkozás?

Előnye, hogy a műtét helyi érzéstelenítésben elvégezhető, így csekély megterheléssel jár. A hüvely középső részén a hüvely hátsó és mellső falának egyesítése. Általában hátsó hüvelyi plasztikai műtéttel kiegészítjük.

#### Mik a beavatkozás esetleges szövődményei?

Szövődmények gyakoriságát emelhetik társbetegségek, élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, családban gyakrabban előforduló betegségek, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei. Ezekről feltétlenül tájékoztassa orvosát.

Hólyag –és végbélsérülés, utóvérzés, vérömleny képződés.

Az esetleges szövődmények elhárítására, ellátására, gyógyítására a feltételek biztosítottak. Hátránya a műtétnek, hogy a hüvely zárása következtében a házasság nem folytatható, ezért csak idős korban javasoljuk.

#### Műtét utáni történések:

A beteg megfigyelése, minimális vérzés lehetséges, amelyet színes folyás követ. Sebfájdalom fokozatosan megszűnik.

#### Várható következmények:

Vizelettartási probléma jelentkezhet, ritkán húzó jellegű alhasi fájdalom. A nemi élet a hüvely zártsága miatt lehetetlen. A hüvely elzárta, a méh nem hozzáférhető, emiatt szabály az ilyen típusú műtét előtt rákszűrés és méhkaparás elvégzése.

Betegtájékoztató és beleegyző lap			
<b>Dokumentum címe:</b>	<b>Kolpoklézis mediána (hüvelyzáró műtét)</b>		
<b>Változat: 03</b>	<b>Hatályos: 2017.05.22.</b>	<b>2.oldal a(z) 2 oldalból</b>	<b>Módosítás 2</b>
<b>Dokumentum száma: Bny./SzN./14</b>	<b>Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos</b>		

### Milyen alternatív megoldás lehetséges?

Az előesett méh visszatartására szolgáló Mayo gyűrű felhelyezése.  
 A gyűrű alkalmazása meg sem közelíti a műtéti megoldás hatékonyságát.

### Mi a teendő a beavatkozás után?

Műtétet követően 6 hétig kímélő életmód, kamillás gátlemosások. 6 hét múlva kontroll vizsgálaton jelentkezzen, panasz esetén azonnal.

### Műtét elmaradásának következményei:

Panaszainak fokozódása várható, illetve az előesett méhszáj kifeléyenesedése, későbbiekben esetleg rosszindulatú elváltozás kialakulása.

### Beleegyezési nyilatkozat

A kolpoklézis mediána műtéti beavatkozásról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyzem, kérem annak elvégzését.

.....  
 a felvilágosítást végző személy

.....  
 beteg/törvényes képviselő aláírása

Siófok, ..... év..... hó..... nap..... óra..... perc

### Elutasító nyilatkozat

A kezelőorvos részletes felvilágosítása – amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazta – ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....  
 a felvilágosítást végző személy

.....  
 beteg/törvényes képviselő aláírása

1.Tanú:.....  
 aláírás

2.Tanú:.....  
 aláírás

Siófok, ..... év..... hó..... nap..... óra..... perc

Ezen lap egy aláírt példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!