

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Kürettage (méhkaparás)		
Változat: 03	Hatályos: 2017.05.22.	1.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./SzN./15	Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos		

Beteg neve: TAJ száma:

Tisztelt Betegünk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy mielőbbi gyógyulása érdekében kürettage műtéti beavatkozás válik szükségessé. A Siófoki Kórház Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály gyógyító csoportja a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy - mindent mérlegelve- döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

A beavatkozás jellege:

Hüvelyi, nőgyógyászati, szülészeti, diagnosztikus és terápiás jellegű beavatkozás.

Diagnózis (jelenlegi egészségi állapot magyarul).....

A beavatkozás tervezett időpontja:

A beavatkozás célja:

Diagnosztikus esetekben szöveti minta nyérése a méh nyálkahártyájáról. A beavatkozás terápiás célja méhszáj és méhtest polip eltávolítása, visszamaradt rezidum (túltengett, megvastagodott méhnyálkahártya) eltávolítása abortusz után, vérzés megszüntetése a hiperpláziás endometrium eltávolításával.

Hogyan történik a beavatkozás?

A beavatkozást az altató orvos által kiválasztott érzéstelenítési módban végezzük. A méhszáj kifogása után szondavizsgálatot követően méhnyaktágítás hegár eszközzel, majd kürettage kanállal a méhnyálkahártyát lekaparjuk. Fractionált (szakaszos) kürettage esetén külön távolítjuk el a cervixből (méhnyak csatornából), illetve a méhürből kikapart anyagot szövettani feldolgozásra.

Mik a beavatkozás esetleges szövődményei?

A szövődmények gyakoriságát emelhetik bizonyos alapbetegségek, élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, családban gyakrabban előforduló betegségek, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei. Ezekről feltétlenül tájékoztassa orvosát.

A méh sérülése (perforáció), mely után hasműtét válhat szükségessé. A műtét utáni napokban gyulladás léphet fel.

Műtét utáni történések:

Műtét után a beteget megfigyeljük, majd amennyiben panaszmentes még aznap osztályunkról távozzhat.

Várható következmények:

Műtét után enyhe alhasi görcsök, kevés vérzés pár napig lehetséges. Gyulladás, láz esetén antibiotikus kezelés szükséges.

Betegtájékoztató és beleegyező lap			
Dokumentum címe:	Kürettage (méhkaparás)		
Változat: 03	Hatályos: 2017.05.22.	2.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./SzN./15	Hatályba helyezte: Dr. Fenyőházi Jenő osztályvezető főorvos		

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

Jelenleg alternatív megoldás nincs.

Mi a teendő a beavatkozás után?

Műtétet követően pár napig kímélő életmód, a kórszövettani lelet megérkezése után a további gyógykezelésről a kezelőorvos dönt. 6 hét múlva kontroll vizsgálaton jelentkezzen, panasz esetén azonnal.

Műtét elmaradásának következményei:

Fennálló panaszainak fokozódása, rosszindulatúvá való elfajulása, vagy a meglévő rosszindulatú daganat gyógykezelésének elmaradása során végzetessé fajulása.

Beleegyezési nyilatkozat

A kürettage műtéti beavatkozásról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, kérem annak elvégzését.

.....
a felvilágosítást végző személy

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

Siófok,..... év..... hó..... nap..... óra..... perc

Elutasító nyilatkozat

A kezelőorvos részletes felvilágosítása – amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazta – ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....
a felvilágosítást végző személy

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

1.Tanú:.....
aláírás

2.Tanú:.....
aláírás

Siófok,..... év..... hó..... nap..... óra..... perc
Ezen lap egy aláírt példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!