

Betegtájékoztató és beleegyező lap

Dokumentum címe:	Orrvérzés/Epistaxis ellátása orrtamponnal		
Változat: 03	Hatályos: 2015.08.04.	1. oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás: 2
Dokumentum száma: Bny./FOG./27	Hatályba helyezte: Dr. Czurkó Géza osztályvezető főorvos		

Beteg neve: TAJ száma:

Tisztelt Betegünk / Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk, hogy Önnek/gyermekének mielőbbi gyógyulása érdekében réteges orrtampon / Foley-katéter / Bellocq tampon behelyezése válik szükségessé, az orrvérzés helyétől és erősségétől függően. A Siófoki Kórház Fül-Orr-Gége Osztály gyógyító csoportja a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy – mindent mérlegelve – döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

A beavatkozás jellege:

Terápiás jellegű beavatkozás (indokolt esetekben altatásban is végezhető eljárás.)

A beavatkozás célja:

Az orrüregi vérzés elállítása.

Diagnózis (jelenlegi egészségi állapot magyarul):

A beavatkozás tervezett időpontja:

Beavatkozás előtti történések:

Az orrüregben lévő véralvadékokat eltávolítjuk az orrüreget kitisztítjuk. A vérzésforrást lehetőleg lokalizáljuk. Gyógyszeres vatta (Novorin, Lidocain, Pantocain) behelyezésével az orr nyálkahártyáját lelohasztjuk, érzéstelenítjük. A nyálkahártya érzéstelenítése miatt gombócot érezhet a torkában, nyelése nehezítetté válhat.

Altatás esetén műtét előtt altató orvos is megvizsgálja a beteget.

Beavatkozás módja:

Az orrüreget réteges orrtamponnal tamponáljuk vagy réteges orrtampon mellé Foley katétert helyezünk be.

Bellocq tampon - ha az orrüreget elől-hátul le kell zárni.

A tamponnal történő vérzéscsillapítás a vérzés blokkolásával teremti meg a vérző érben a bealvadás feltételeit.

Beavatkozás utáni történések:

Altatás miatt előfordulhat aluszékonyság, nyugtalanság-hánykolódás, hányinger, hányás. Ez kellemetlen, de nem ritka velejárája az altatásos műtéteknek. Elképzelhető, hogy a karján, lábán még lesz egy kis csappal ellátott műanyag tű, mely az esetleges infúzió bekötéséhez kell (ha a kanül megtartható nem kell újra megszúrni). A legfontosabb, hogy minden ilyen esetben szóljon nővérnek.

Vérnyomását rendszeresen ellenőrizzük, rutin laboratóriumi vizsgálatokat végzünk, szükség esetén belgyógyászati konzíliumot kérünk.

Szövődmények:

Általános altatási szövődmények: erről az altatóorvos tájékoztatja Önt.

A beavatkozás lehetséges szövődményei:

- gyógyszerallergia, érzéstelenítő-, altatószerre
- az előkészítő injekció szövődményei (tályog, ér- és idegsérülés, fájdalom, hegek)
- utóvérzés (a tamponon átütő vérzés az első 24 órában fordulhat elő): ritkán fordul elő, műtét utáni állapotban a vér a légcsőbe kerülhet, veszélyes oxigénhiány, fulladás alakulhat ki. Ritka esetekben előfordulhat, hogy ismételt tamponálásra vagy a tamponálás kiegészítésére van szükség.
- extrém esetben vérátömlesztésre kerülhet sor.
- helyi gyulladás, arcüreggyulladás, tályog képződés
- garatsérülés

Betegtájékoztató és beleegyező lap

Dokumentum címe:	Orrvérzés/Epistaxis ellátása orrtamponnal		
Változat: 03	Hatályos: 2015.08.04.	2.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás: 2
Dokumentum száma: Bny./FOG./27	Hatályba helyezte: Dr. Czurkó Géza osztályvezető főorvos		

Mi a teendő beavatkozás után?

2-4 napos kórházi megfigyelés szükséges, az első két órában szoros nővéri – orvosi felügyelettel. A műtét után, amint az érzéstelenítő hatása megszűnik, fájdalmat érezhet a beteg. Természetesen adunk fájdalomcsillapítót. Önnek csak jeleznie kell, ha igényli. Fájdalomcsillapítás gyermekeknél kúp, felnőtteknél injekció illetve tablettá formájában.

Két óra elteltével lehet inni. Ne kapjon szénsavas italt, csípős – fűszeres ételt. Szívószál használata tilos!

Fürdeni természetesen szabad, **de nem szabad forró vízben, és TILOS HAJAT MOSNI!**

Egy hétig otthon kímélő életmód javasolt, gyermek ne menjen iskolába – óvodába, felnőtt ne dolgozzon. Műtét után 2 hétig vérnyomást emelő tevékenységektől pl. sport, torna, nehéz tárgyak emelése tartózkodni kell. Nem szabad erős kávé, alkoholt inni. Szakorvosi kontroll vizsgálat javasolt.

Ismételt vérzés esetén azonnali gégészeti vizsgálat és ellátás.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

A beavatkozást nem végezzük el.

A beavatkozás elmaradásának következményei:

Az akut vérzés életet veszélyeztető állapot, mely ellátás nélkül akár halállal is végződhet.

Amennyiben a vérzés magától eláll, az ismétlődhet, illetve a kiváltó ok pl. magas vérnyomás szövődményei léphetnek fel.

Beleegyeési nyilatkozat

A beavatkozásról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, kérem annak elvégzését.

.....
tájékoztatót adó orvos neve

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

(Írástudatlan személynél két tanú jelenlétével kell feljegyezni a beleegyezést.)

Siófok,évhónapóraperc

Elutasító nyilatkozat

A kezelőorvos részletes felvilágosítása – amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazta – ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....
tájékoztatót adó orvos neve

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

1. Tanú:
aláírás

2. Tanú:
aláírás

Siófok,évhónapóraperc

Ezen lap egy aláírt példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!