

Betegtájékoztató és beleegyező lap

Dokumentum címe:	Traumás (baleseti eredetű) fülműtétek		
Változat: 03	Hatályos: 2015.08.04.	1.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./FOG./01	Hatályba helyezte: Dr. Czurkó Géza osztályvezető főorvos		

Beteg neve: TAJ szám:

Tisztelt Betegünk / Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk, hogy Önnek/gyermekének mielőbbi gyógyulása érdekében sürgős fülműtét elvégzése válik szükségessé. A Siófoki Kórház Fül-Orr-Gége Osztály gyógyító csoportja a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy – mindent mérlegelve – döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

A beavatkozás jellege:

Terápiás jellegű műtéti beavatkozás.
Történhet helyi érzéstelenítésben vagy altatásban.
Gyermekeknél mindig altatásban.

A beavatkozás célja:

- a hallójárat - középfül – csecsnyúlvány károsodott képleteinek helyreállítása esetleges ideg-, ér-, keményagyhártya sérülés ellátása, a fenyegető szövődmények megelőzése

Diagnózis (jelenlegi egészségi állapot magyarul):

A beavatkozás tervezett időpontja:

Beavatkozás előtti történések:

Helyi érzéstelenítésnél:

- teljes körű kivizsgálás, osztályos felvétel, röntgen, audiológiai kivizsgálás
- fürdés (fürdetés), hajmosás, a fül körüli haj leborotválása
- gyógyszeres előkészítés
- műtéti napon éjfél-től a műtetre készülőnek **TILOS** ennie és innia!
- az előkészítő injekció megadása után nem kelhet fel, a műtőbe viszik.
- műfogsorát ne viselje

Altatásnál:

- teljes körű kivizsgálás, osztályos felvétel, röntgen, audiológiai kivizsgálás
- fürdés (fürdetés), hajmosás, a fül körüli haj leborotválása
- műtét előtt altató orvos is megvizsgálja a beteget
- műtéti napon éjfél-től a műtetre készülőnek **TILOS** ennie és innia!
- műtét előtt kb. fél órával megkapja az előkészítő, előaltató injekciót, még a kórteremben, innentől kezdve **TILOS** és **VESZÉLYES** felkelni
- műfogsorát ne viselje

Beavatkozás módja:

Helyi vagy általános érzéstelenítésben a beteg fül mögött fél centiméterrel 5-8 cm-es bőrmetszést ejtünk, ebből feltárjuk a csecsnyúlványt, a hallójárat csontos falát. A sérült képleteket helyreállítjuk, illetve eltávolítjuk. A sebet lehetőség szerint elsődlegesen zárjuk vagy nyitva kezeljük.

Szövődmények:

Már a műtét során találhatunk kialakult szövődményeket, a műtét is okozhat, a műtét után közvetlenül, vagy néhány nap múlva is megjelenhetnek:

- az egyébként ép hallócsontláncolat sérülése
- az arcideg sérülése (részleges vagy teljes, átmeneti vagy végleges)
- az agyhártya sérülése, mely agyhártyagyulladásra fenyeget
- az agyban kialakult vagy kialakuló tályog
- a csecsnyúlvány üregét hátulról érintő nagy nyaki véna sérülése, mely vérzéssel vagy gennyes gyulladással, mely elzáródással, illetve vérrög képződéssel fenyeget, melyek az erekben test szerte szóródhatnak
- a belsőfül sérülése, gyulladása, mely átmeneti vagy végleges süketességgel, egyensúlyzavarral fenyeget
- a dobüreg alatt lévő nagy verőér sérülése, mely elvérzéssel fenyeget

Betegtájékoztató és beleegyező lap

Dokumentum címe:	Traumás (baleseti eredetű) fülműtétek		
Változat: 03	Hatályos: 2015.08.04.	2.oldal a(z) 2 oldalból	Módosítás 2
Dokumentum száma: Bny./FOG./01	Hatályba helyezte: Dr. Czurkó Géza osztályvezető főorvos		

Beavatkozás utáni történések, várható következmények:

6-8 napos szoros kórházi megfigyelés, kezelés szükséges.

Az alkalmazott antibiotikus kezelés, naponkénti kötőcsere mellett gyors javulás várható. A sebet egy hét után hagyjuk záródni. A beteg ezután otthonába bocsátható, néhány naponkénti ellenőrzés mellett.

Amennyiben valamely előzőekben jelzett szövődmény következik be, annak azonnali ellátása értelemszerű.

Mi a teendő beavatkozás után?

Rossz közérzettel, fájdalommal, szédüléssel, hányingerrel, hányással, esetleg fülzúgással számolni kell. Minden állapotváltozást a nővérrel – kezelőorvossal azonnal közölni kell.

Szédülő beteget kísérni kell, elesés újabb szövődmény forrása lehet.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

Ha a konzervatív kezeléstől teljes vagy megfelelő funkció várható, a szövődmények lehetősége csekély, magunk sem ajánlunk műtétet.

A műtét elmaradásának következményei:

A sérült képletek funkció zavara, korai vagy késői szövődmények megjelenése.

Amennyiben a betegnek műtét ajánlunk, az szakmailag mindig a kisebb rizikót jelenti.

Beleegyezési nyilatkozat

A beavatkozásról a tájékoztatót elolvastam, az orvos általi szóbeli tájékoztatást megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, kérem annak elvégzését.

.....
tájékoztatót adó orvos neve

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

(Írástudatlan személynél két tanú jelenlétével kell feljegyezni a beleegyezést.)

Siófok,évhónapóraperc

Elutasító nyilatkozat

A kezelőorvos részletes felvilágosítása – amely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazta – ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

.....
tájékoztatót adó orvos neve

.....
beteg/törvényes képviselő aláírása

1. Tanú:
aláírás

2. Tanú:
aláírás

Siófok,évhónapóraperc

Ezen lap egy aláírt példánya a beteg dokumentációjához csatolandó!